

Morning-aftermiddelen na onveilige seks

Als je onveilige seks hebt gehad en bang bent dat je risico loopt op een ongewenste zwangerschap, kun je dit met noodanticonceptie misschien voorkomen. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt.

Wanneer loop ik risico?

Als er sperma of voorvocht in de vagina is gekomen tijdens onbeschermd seks, loop je risico op een zwangerschap. Een zaadcel kan dan een eicel bevruchten, waarna de bevruchte eicel zich in de baarmoeder nestelt. Ook als je wel anticonceptie hebt gebruikt, maar hiermee iets mis is gegaan*, kun je zwanger raken.

* Bijvoorbeeld:

- *Het condoom is gescheurd.*
- *Je hebt de anticonceptie verkeerd, onregelmatig of te laat gebruikt.*
- *Je hebt overgegeven of diarree gehad waardoor de pil minder betrouwbaar is.*

De morning-aftermiddelen

De morning-afterpil

De morning-afterpil stelt je eisprong uit, zodat de zaadcellen in je baarmoeder geen eitje kunnen bevruchten.

Let op: de morning-afterpil werkt dus alleen als je je eisprong nog niet hebt gehad!

Er zijn twee soorten morning-afterpillen:

- Met het hormoon levonorgestrel. Deze kun je tot 72 uur (3 dagen) nadat je onveilige seks gehad hebt slikken. De bekendste is Norlevo.
- Met ulipristalacetaat, een stof die je hormoonstelsel beïnvloedt. Deze kun je tot 120 uur (5 dagen) na onbeschermd seks innemen. Hiervan is EllaOne het meest bekende merk.

Voor beide pillen geldt: neem ze het liefst binnen 12 tot 24 uur in. Hoe sneller, hoe beter. Dan is de kans op een zwangerschap namelijk het kleinst. Ben je twee weken na je uitgerekende menstruatie datum nog niet ongesteld? Doe dan alsnog een zwangerschapstest.

Koperspiraal

Een andere morning-after methode is het koperspiraaltje. Je kunt binnen 5 dagen nadat je onbeschermd seks hebt gehad een koperspiraaltje laten plaatsen. Dit kan bij de

huisarts, gynaecoloog, verloskundige en sommige Sense-locaties. Het koperspiraaltje zorgt ervoor dat een eicel niet bevrucht kan worden. En als er tóch een eitje bevrucht is, kan het zich niet innestelen in het baarmoederslijmvlies. Je kunt dit spiraaltje 5-10 jaar laten zitten.

Bijwerkingen

Je kunt de eerste paar dagen last hebben van bijwerkingen van de morning-afterpil, maar dat hoeft niet. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en/of hoofdpijn. Ook gevoelige borsten en tussentijds bloedverlies kunnen voorkomen. Sommige medicijnen kunnen invloed hebben op de werking van de morning-afterpil. Lees altijd de bijsluiter.

Heb je een leverziekte, darmziekte of gebruik je maagzuurremmers? Overleg dan met je arts. Van de koperspiraal kan je menstruatie(kramp) heftiger worden of langer duren.

Kosten

De morning-afterpillen zijn te koop bij de drogist en kosten tussen de €10 en €20. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de morning-afterpil als je die op recept krijgt. Dit is dan wel te zien op de afrekening van je zorgverzekering. Als je niet wilt dat een ouder of partner ervan weet, kun je de morning-afterpil dus beter bij de drogist halen.

Je kunt ook een koperspiraal laten plaatsen bij de huisarts of verloskundige, maar je moet het spiraaltje wel zelf betalen. Het hangt van je leeftijd en verzekering af of je dat vergoed krijgt. Als je het spiraaltje door een gynaecoloog laat plaatsen, kost dat minimaal €150.

Meer informatie en antwoorden

Scan onderstaande code(s) met de camera van je telefoon voor meer informatie over de morning-aftermiddelen.



Alles over seks speciaal voor jongeren tot 25 jaar vind je op sense.info. Ook over (on)veilige seks en morning-aftermiddelen. Je kunt de morning-aftertest doen om te bepalen of een morning-aftermiddel verstandig is.



seksualiteit.nl 

Voor volwassenen vind je op seksualiteit.nl alles over seksualiteit gedurende het leven. Ook hier vind je informatie over (on)veilige seks, morning-aftermiddelen en de morning-aftertest.



zanzu.nl

Alles over seksuele gezondheid in 16 talen (tekst en geluid) vind je op zanzu.nl. Ook hoe je een onbedoelde zwangerschap kunt voorkomen en welke morning-aftermiddelen er zijn.